

Biquinol

A Suppositoire
Adultes

COMPOSITION :

Succinate basique de bismuth	50 mg
Quantité correspondante en bismuth	37 mg
Cinéole (eucalyptol)	45 mg
Gaiacol	38 mg
Camphre synthétique	30 mg
Excipients : glycérides hémi-synthétiques solides (Suppocire LB®),	
Pour un suppositoire de 2,7g	
Boîte de 10 suppositoires.	

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE : PRÉPARATION POUR LA GORGE (R : Système respiratoire).

MERCK Médication Familiale - 18C, Bd Winston Churchill - 21070 DIJON

Fabricant : SPPH - 5, impasse Champeau - 21801 QUÉTIGNY Cedex

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

BIQUINOL ADULTES est préconisé en cas d'état congestif de l'oropharynx : maux de gorge, enrouements.

NB : devant l'apparition de fièvre, de frissons, d'altération de l'état général, consultez votre médecin afin d'adapter votre traitement.

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

BIQUINOL ADULTES NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- insuffisance rénale
- lésion ou irritation récente de l'anus ou du rectum (contre-indication liée à la forme suppositoire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN OU DE VOTRE MÉDECIN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES : BIQUINOL ADULTES contient des dérivés terpéniques qui ont pu entraîner à doses excessives des accidents neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant. Respectez les posologies et la durée de traitement préconisées (Cf. rubrique Posologie).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Consultez votre médecin en l'absence de guérison après 5 jours de traitement. En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN OU DE VOTRE MÉDECIN.

NE JAMAIS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS : AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE PHARMACIEN OU À VOTRE MÉDECIN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT : Il est préférable de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement, sauf avis contraire de votre médecin. En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE :

Voie rectale. RÉSERVÉ À L'ADULTE. 1 à 3 suppositoires par jour.

DURÉE DU TRAITEMENT : Si les symptômes persistent au-delà de 5 jours, consultez votre médecin.

CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE : En cas d'intoxication accidentelle, (notamment fréquente chez les jeunes enfants), consultez immédiatement votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS : Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants : • douleurs épigastriques, nausées, vomissements, liés au gaiacol • irritation locale liée à la forme suppositoire. En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non-respect des doses préconisées : possibilité d'agitation, de confusion chez les personnes âgées.

NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS ET À SIGNALER À VOTRE PHARMACIEN OU À VOTRE MÉDECIN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION : NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION INDICUÉE EN CLAIR SUR L'EMBALLAGE.

DATE DE DERNIÈRE RÉVISION DE LA NOTICE : Septembre 2005.



En France métropolitaine, MERCK Médication Familiale participe à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. MERCK Médication Familiale vous demande en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament, vide ou non.

MERCK Médication Familiale

18C, Bd Winston Churchill - 21070 DIJON

ART. N° ANAMMF004A

Biquinol

Suppositorie for Adults

COMPOSITION:

Basic bismuth succinate	50mg
Corresponding quantity of bismuth	37mg
Cineole (eucalyptol)	45mg
Guaiacol	38mg
Synthetic camphor	30mg

Excipients: solid hemi-synthetic glycerides (Suppocire LB®)

For one suppository of 2.7g

Box of 10 suppositories.

PHARMACO-THERAPEUTIC CLASS: THROAT PREPARATION (R: Respiratory system).

MERCK Médication Familiale - 18C, Bd Winston Churchill - 21070 DIJON - FRANCE

Manufacturer : SPPH - 5, impasse Champeau - 21801 QUETIGNY Cedex - FRANCE

IN WHICH CASE(S) CAN THIS DRUG BE USED?

BIQUINOL ADULTS is recommended in congestive conditions of the oropharynx: sore throats, hoarseness.

NB: if fever, shivering and impairment of general health occur, consult your doctor in order to adapt your treatment.

WARNING!

WHEN SHOULD THIS DRUG NOT BE USED?

BIQUINOL ADULTS MUST NOT BE USED in the following cases:

• renal insufficiency • lesion or recent irritation of the anus or rectum (contra-indication related to the suppository form).

IN CASE OF DOUBT, IT IS ESSENTIAL TO CONSULT YOUR PHARMACIST OR YOUR DOCTOR.

SPECIAL WARNINGS: BIQUINOL ADULTS contains terpene derivatives which have been known at excessive doses to result in neurological accidents of the convulsion type in infants or children. Observe the recommended dosages and duration of treatment (refer to heading "Dosage").

PRECAUTIONS FOR USE: Consult your physician if no cure is obtained after 5 days of treatment.

In the event of recent epilepsy or a history thereof.

ASK YOUR DOCTOR'S ADVICE.

IF IN DOUBT, DO NOT HESITATE TO SEEK THE ADVICE OF YOUR PHARMACIST OR YOUR DOCTOR.

KEEP THIS DRUG OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

DRUG INTERACTIONS AND OTHER INTERACTIONS: IN ORDER TO AVOID POSSIBLE INTERACTIONS BETWEEN SEVERAL DRUGS, YOU SHOULD SYSTEMATICALLY REPORT ANY CURRENT TREATMENT TO YOUR PHARMACIST OR DOCTOR.

PREGNANCY - BREASTFEEDING : It is preferable not to take this drug during pregnancy or breastfeeding, except contrary advice of your doctor.

In the event of breastfeeding, it is preferable not to take this drug.

HOW SHOULD THIS DRUG BE USED?

DOSAGE AND MODE OF ADMINISTRATION: Rectal route. RESTRICTED TO ADULTS. 1 to 3 suppositories per day.

DURATION OF THE TREATMENT: If symptoms persist for more than 5 days, consult your doctor.

MEASURES TO TAKE IN CASE OF OVERDOSAGE:

In the event of accidental poisoning, consult your doctor immediately.

UNDESIRABLE AND UNPLEASANT EFFECTS:

Like all active products, this drug can, in some people, produce more or less unpleasant effects: • epigastric pains, nausea and vomiting related to guaiacol • local irritation related to the suppository form.

Owing to the presence of terpene derivatives and in the event of failure to observe the recommended doses: possibility of agitation and confusion in elderly persons.

REPORT ANY UNDESIRABLE OR UNPLEASANT EFFECT NOT MENTIONED IN THIS LEAFLET TO YOUR PHARMACIST OR DOCTOR.

STORAGE: DO NOT USE PAST THE EXPIRY DATE INDICATED IN CLEAR ON THE PACKAGE.

DATE OF LAST LEAFLET REVISION: September 2005.

MERCK Médication Familiale
18C, Bd Winston Churchill - 21070 DIJON