

# DULCILARMES®

Povidone

collyre en solution

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement ou votre maladie.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que DULCILARMES, collyre en solution, et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DULCILARMES, collyre en solution ?
3. Comment utiliser DULCILARMES, collyre en solution ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DULCILARMES, collyre en solution ?
6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE DULCILARMES, collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est SUBSTITUT LACRYMAL (S : organe des sens).

Ce collyre est indiqué dans le traitement symptomatique de la sécheresse oculaire.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER DULCILARMES, collyre en solution ?

**N'utilisez jamais DULCILARMES, collyre en solution :**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans DULCILARMES, collyre en solution.

## Faites attention avec DULCILARMES, collyre en solution :

### Mises en garde :

- Ne pas injecter, ne pas avaler.
- Le port des lentilles de contact souples (type hydrophile) doit être évité durant le traitement en raison du risque d'absorption du conservateur (cétrimide).

### Précautions d'emploi :

- En cas de persistance des symptômes, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN, afin qu'il adapte votre traitement.
- Eviter de toucher l'œil avec l'embout du flacon.
- Reboucher le flacon après utilisation.

### Utilisation d'autres médicaments :

- En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendez 15 minutes entre les deux instillations.
- Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Grossesse et allaitement :

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Évitez de conduire votre voiture ou d'utiliser des machines si votre vision se trouble lors de l'instillation du collyre.

### 3. COMMENT UTILISER DULCILARMES, collyre en solution ?

#### Posologie :

Instillez 1 goutte de collyre, 4 à 6 fois par jour, si la fréquence et la gravité des symptômes le nécessitent.

#### Mode d'administration :

Voie locale.

#### EN INSTILLATION OCULAIRE.

- Se laver soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation.
- Éviter le contact de l'embout avec l'œil ou les paupières.
- Instiller 1 goutte de collyre dans le cul-de-sac conjonctival inférieur de l'œil à traiter en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas.
- Reboucher le flacon après usage.

#### Fréquence d'administration :

Instillez 1 goutte de collyre lorsque les troubles oculaires (sècheresse, brûlure, démangeaisons) se font sentir. Les instillations sont à répartir 4 à 6 fois dans la journée.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DULCILARMES, collyre en solution est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Occasionnellement : sensation transitoire de brûlure ou d'œil collé.
- Rarement : réactions d'irritation ou d'hypersensibilité.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5. COMMENT CONSERVER DULCILARMES, collyre en solution ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser DULCILARMES, collyre en solution après la date de péremption mentionnée sur le flacon. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Après ouverture, ce médicament ne doit pas être conservé plus de 28 jours.

Notez en clair la date d'ouverture sur l'emballage.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### 6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient DULCILARMES, collyre en solution ?

#### La substance active est :

Povidone . . . . . 1,5 g  
Pour 100 ml de solution

#### Les autres composants sont :

Cétrimide, chlorure de sodium, édétate disodique, phosphate disodique dihydraté, phosphate monosodique dihydraté, eau purifiée.

### Qu'est ce que DULCILARMES, collyre en solution et contenu de l'emballage extérieur ?

Collyre en solution en flacon de 10 ml.

#### Titulaire / Exploitant :

#### **HORUS PHARMA**

148, avenue G. Guynemer  
06700 Saint-Laurent du Var

#### Fabricant :

#### **EXCELVISION**

27, rue de la Lombardièrre  
07100 Annonay

Sous license Allergan Pharmaceuticals Ireland, Country Mayo, Irlande.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 28/01/2008.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France). Cette notice est disponible en caractères agrandis ou en traduction braille auprès de Handicapzéro. N° vert 0800 39 39 51.



148, avenue G. Guynemer - 06700 Saint-Laurent du Var  
Tél. : 04 93 19 54 03 - Fax : 04 93 19 54 09 - [www.horus-pharma.fr](http://www.horus-pharma.fr)