

PASTILLES Biclotymol 20 mg

Lisez attentivement cette notice, elle contient des informations importantes.

• Ce médicament est une spécialité d'AUTOMEDICATION qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin. • La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical. • Cardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. • Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

HUMEX MAL DE CORCE ORANGE 20 mg, pastille HUMEX MAL DE CORCE MIEL CITRON 20 mg, pastille

COMPOSITION POUR UNE PASTILLE :

Biclotymol 20,00 mg

Excipients : Saccharose, glucose liquide. Pastilles orange : Huile essentielle d'orange, jaune orangé S. Pastilles miel citron : Miel de châtaignier, arôme citron 9722, huile essentielle de menthe poivrée.

FORME PHARMACEUTIQUE : Pastille à sucer, boîte de 24.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

ANTISEPTIQUE LOCAL (R = système respiratoire)

NOM ET ADRESSE DE L 'EXPLOITANT :

Laboratoires URCO 42 rue de Longvic 21300 CHENÔVE - FRANCE

DANS QUEL CAS POUVEZ-VOUS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est préconisé dans le traitement de courte durée (5 jours) des maux de gorge peu intenses, sans fièvre.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE DEVEZ-VOUS PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

VOUS NE DEVEZ PAS PRENDRE ce médicament en cas d'antécédent d'allergie aux antiseptiques de la classe des biphénols. VOUS NE DEVEZ PAS DONNER ce médicament aux enfants de moins de 6 ans.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS. Précautions d'emploi

L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il est susceptible de modifier l'équilibre microbien de la bouche et de la gorge. En cas de survenue : • de fièvre,

■ de crachats purulents,

- d'une gêne à la déglutition des aliments,

comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours, PRENEZ L'AVIS DE VOTRE MEDECIN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS NOCIVES ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU PHARMACIEN TOUT TRAITEMENT EN COURS, en particulier avec d'autres antiseptiques locaux.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Laissez fondre lentement la pastille dans la bouche.

ESPACEZ LES PRISES D'AU MINIMUM 4 HEURES.

DUREE DU TRAITEMENT _____

La durée d'utilisation est limitée à 5 jours.

QUELS SONT LES EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS DU MEDICAMENT ?

- Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants.

- Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant, et en particulier ceux qui ne seraient pas mentionnés dans cette notice.

PASTILLES Biclotymol 20 mg

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE DU MEDICAMENT PAR LE PATIENT

Saccharose, glucose.

Au cours d'un régime hypocalorique et chez le diabétique, tenez compte de la présence de sucre dans la pastille (1,36 g de saccharose par pastille orange, 1,33 g de saccharose par pastille miel citron).

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION INSCRITE SUR L'EMBALLAGE

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

08/2007

COMMENT DEVEZ-VOUS UTILISER CE MEDICAMENT ?

N'utilisez pas cette pastille chez l'enfant de moins de 6 ans.

POSOLOGIE

Adultes : 4 à 6 pastilles par jour.

Enfants à partir de 6 ans : 1 à 3 pastilles par jour.