



OligoCure

Manganèse
Cuivre
Or



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou
- Si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

a) DÉNOMINATION

OligoCure, solution buvable.

Manganèse 92,5 µg / Cuivre 105 µg / Or 15 µg.

b) COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

pour 100 ml

GLUCONATE DE MANGANÈSE 30,00 mg

(soit 3,70 mg de manganèse)

GLUCONATE DE CUIVRE 30,00 mg

(soit 4,20 mg de cuivre)

OR COLLOÏDAL 0,60 mg

Excipients : Acide benzoïque, eau purifiée.

Le godet comprend 2 graduations correspondant à 2,5 ml de solution (1 dose) et à 5 ml de solution (2 doses).

c) FORME PHARMACEUTIQUE

Solution buvable en flacon de 60 ml (24 doses de 2,5 ml).

d) CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE

À VISÉE ANTI-ASTHÉNIQUE (A : Appareil digestif et métabolisme)

e) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE / EXPLOITANT

LABCATAL
7, Rue Roger Salengro - B.P. 305
92541 MONTROUGE Cedex

f) NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

LABCATAL - ZI du Mont Blanc
1, rue de l'Industrie - B.P. 267
74106 ANNEMASSE Cedex

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est indiqué dans les états de fatigue passagers.

3. ATTENTION !

a) DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- Allergie connue à l'un des constituants de la solution.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

c) INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

d) GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

4. COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

a) POSOLOGIE

RÉSERVÉ À L'ADULTE ET À L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.

Adulte : 2 doses par jour (contenu de la deuxième graduation du godet 5 ml), en une prise.

Enfant de 6 à 15 ans : 1 dose par jour (contenu de la première graduation du godet 2,5 ml).

b) MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Remplir le godet à ras des graduations en pressant légèrement sur le flacon. Revisser le flacon après chaque utilisation.



2,5 ml



5 ml

Voie orale.

c) FRÉQUENCE ET MOMENTS AUXQUELS LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

Les doses sont à prendre :

- de préférence le matin à jeun,
- ou loin des repas.

Garder le contenu du godet 1 à 2 minutes sous la langue avant d'avaler.

d) DURÉE DU TRAITEMENT

Durée de traitement limitée à 4 semaines.

5. EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS

CE MÉDICAMENT PEUT ENTRAÎNER CHEZ CERTAINES PERSONNES DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNANTS.
SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

6. CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

2 décembre 2010

MÉDICAMENT AUTORISÉ N° 340094909709

LABCATAL