

# Doli

## Mal de gorge

Héxamidine-Tétracaïne  
Solution pour pulvérisation buccale

SANOFI

**Lisez attentivement cette notice car elle contient des informations importantes.**

Ce médicament est une spécialité d'AUTOMÉDICATION qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.

La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical.  
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.  
Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

### IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

#### Composition

Diisétionate d'hexamidine..... 0,100 g  
Chlorhydrate de tétracaïne ..... 0,050 g  
Excipients : glycérol, saccharose, phosphate disodique dodécahydraté, huile essentielle de menthe soluble, acide citrique monohydraté, eau purifiée pour 100 g.

#### Forme pharmaceutique et présentation

Solution pour pulvérisation buccale (Flacon de 30 g avec pompe doseuse).

#### Classe pharmaco-thérapeutique

ANTISEPTIQUE LOCAL / ANESTHÉSIQUE LOCAL (R : Système respiratoire)

#### Titulaire et exploitant

sanofi-aventis France  
1-13, boulevard Romain Rolland  
75014 Paris-France  
Information Patient : N° vert 0800 222 555  
Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

#### Fabricant

SOFARIMEX Cacém - Portugal

### DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans en cas de mal de gorge peu intense et sans fièvre, d'aphtes et de petites plaies de la bouche.

### ATTENTION !

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

#### Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ?

VOUS NE DEVEZ PAS PRENDRE ce médicament en cas d'antécédents d'allergie aux anesthésiques locaux, à l'hexamidine ou à l'un des autres constituants.  
**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

#### Mises en garde spéciales

NE LAISSEZ PAS CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.

- L'anesthésie provoquée par ce médicament au niveau de la gorge peut favoriser les fausses routes (toux au cours d'un repas avec impression « d'avaler de travers ») lors de la déglutition des aliments. Il est donc impératif de ne pas utiliser ce médicament avant les repas ou avant la prise de boisson.
  - L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche, de la gorge.
  - Respecter la posologie indiquée : pris en quantité importante ou de façon répétée, ce médicament en passant dans la circulation sanguine, est susceptible de retentir sur le système nerveux avec possibilité de convulsions et sur le cœur.
- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase-isomaltase (maladies héréditaires rares).

#### Précautions d'emploi

Cette spécialité ne doit pas être mise en contact avec les yeux, introduite dans le nez ou dans les oreilles.

#### - Mal de gorge

En cas de survenue de fièvre, d'expectorations (crachats) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments, comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours : **CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN.**

- **Aphtes, petites plaies de la bouche**

En cas de lésions étendues, d'extensions des lésions, d'apparition de fièvre : **CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN. EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**Interactions médicamenteuses et autres interactions**

- Ne pas utiliser en même temps plusieurs médicaments contenant un antiseptique. **AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.**

**Ce médicament contient un antiseptique local (diisétionate d'hexamidine) et un anesthésique local (chlorhydrate de tétracaïne). D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir « posologie »).**

**Grossesse - Allaitement**

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

**Sportifs**

L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif (anesthésique local) pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopages.

**Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients**

Saccharose (40 mg par pulvérisation).

**COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?**

**Posologie**

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 ans.

Adulte : 1 pulvérisation dans la gorge à renouveler si besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 6 pulvérisations par 24 heures.

Enfants de 12 à 15 ans : 1 pulvérisation dans la gorge à renouveler si besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 3 pulvérisations par 24 heures.

**Mode et voie d'administration**

Pulvérisation buccale.

**Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré Il est impératif de ne pas utiliser ce médicament avant les repas ou avant la prise de boisson.** Les prises doivent être espacées d'au moins 4 heures.

**Durée du traitement**

La durée d'utilisation est limitée à 5 jours.

**EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS**

*CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS:*

- éruptions cutanées : dans ce cas, arrêtez le traitement,
- possibilité d'engourdissement passager de la langue,
- en cas de fausse route (toux au cours d'un repas avec impression « d'avaler de travers ») il est conseillé d'interrompre le traitement et de demander avis à un médecin.

**SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.**

**CONSERVATION**

**NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR. À CONSERVER À UNE TEMPÉRATURE NE DÉPASSANT PAS + 30 °C.**

**DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE**

Décembre 2011.