

# BIOCIDAN 0,25 pour mille

Bromure de céthexonium

## **IDENTIFICATION DU MEDICAMENT**

### • DENOMINATION

BIOCIDAN 0,25 pour mille.

### • COMPOSITION

Bromure de céthexonium.....0,025 g  
Chlorure de sodium.....1,40 g  
Eau pour préparations injectables.....q.s.p. ....100 ml

### • FORME PHARMACEUTIQUE

Collyre  
Flacon compte-gouttes de 10 ml

### • CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTISEPTIQUE. (Organes sensoriels)

### • NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT:

MENARINI FRANCE  
1/7, Rue du Jura  
Silic 528,  
94633 RUNGIS Cedex

### Fabricant :

EXCELVISION  
Rue de la Lombardière  
07100 Annonay

## **DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?**

Ce médicament est un collyre (gouttes oculaires) contenant un antiseptique, destiné au traitement d'appoint des affections superficielles de l'œil et de ses annexes.

## **ATTENTION!**

### **DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?**

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'antécédents d'allergie au céthexonium ou autres ammoniums quaternaires.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### • MISE EN GARDE SPECIALE

En cas d'apparition de symptômes anormaux (rougeur et/ou douleur de l'œil), interrompre le traitement et consulter votre médecin.

### • PRECAUTIONS D'EMPLOI

- L'utilisation de ce collyre doit être évitée chez les porteurs de lentilles de contact chez qui le risque d'intolérance locale est majoré.
- Respecter la posologie préconisée et ne pas prolonger le traitement au-delà de 15 jours.
- Refermer le flacon soigneusement après usage.
- En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre au minimum 15 minutes entre chaque instillation.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN**

### • INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS, EN PARTICULIER LES AUTRES COLLYRES UTILISES.

23112702

• **GROSSESSE - ALLAITEMENT**

Il n'existe pas de données cliniques. D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement, de toujours demander l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin avant d'utiliser un médicament.

**COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?**

• **POSOLOGIE:**

Instiller 1 goutte dans l'œil 3 à 4 fois par jour.

• **MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION:**

Voie ophtalmique.

En regardant vers le haut et en tirant la paupière inférieure vers le bas, instiller 1 goutte dans l'œil 3 à 4 fois par jour pendant 7 jours.

Utilisation du flacon compte-gouttes :

- Visser à fond le capuchon perforateur afin de percer l'embout du flacon.
- Pour utiliser le collyre, dévisser le capuchon et instiller les gouttes en pressant légèrement le flacon entre le pouce et l'index.
- Instiller le collyre dans l'œil ou les yeux malade(s) en regardant vers le haut et en tirant la paupière inférieure vers le bas.
- Après usage, revisser le capuchon pour assurer la fermeture du flacon et remettre le flacon dans sa boîte.



Attention ne pas toucher l'œil avec l'extrémité du flacon.

**DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN**

• **DUREE DU TRAITEMENT:**

En moyenne 7 jours.

Ne pas prolonger le traitement au-delà de 15 jours.

**EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS**

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS : IRRITATION LOCALE, ALLERGIE. EN CE CAS ARRETER LE TRAITEMENT.

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

**CONSERVATION**

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

• **PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION**

A conserver à une température inférieure à 25°C.

Ce médicament ne doit pas être conservé plus de 28 jours après l'ouverture du flacon. Nous vous recommandons de noter la date d'ouverture sur l'emballage.

**DATE DE REVISION DE LA NOTICE**

Octobre 2001.



**MENARINI France, 1/7 Rue du Jura  
Siilic 528 - 94633 RUNGIS cedex - 01 45 60 77 20**



23112702