

HOMÉOPLASMINE®

POMMADE

IRRITATIONS DE LA PEAU

COMPOSITION POUR 100 g

Teinture de Souci des jardins	0,1 g
<i>Calendula officinalis</i> TM	
Teinture de Phytolaque	0,3 g
<i>Phytolacca decandra</i> TM	
Teinture de Bryone	0,1 g
<i>Bryonia dioica</i> TM	
Teinture de Benjoin du Laos	0,1 g
<i>Benzoe</i> TM	
Acide borique	4,0 g
Excipient : vaseline.	

FORME PHARMACEUTIQUE

Pommade.

Tube petit modèle de 18 g et tube grand modèle de 40 g.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

Protecteur cutané (D. Dermatologie).

Titulaire et exploitant :

Laboratoires BOIRON
20, rue de la Libération
69110 Ste-Foy-lès-Lyon - France

Dans quel cas utiliser ce médicament

Traitement d'appoint des irritations de la peau.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

HOMÉOPLASMINE® ne doit pas être utilisé :

- chez l'enfant de moins de 30 mois,
- en cas d'antécédent d'hypersensibilité à l'un des composants,
- sur des lésions infectées ou suintantes.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales

En raison de la présence d'acide borique, ce médicament ne doit pas être utilisé de façon prolongée ni répétée, sur une peau lésée (notamment brûlée), sur une grande surface, en pansement occlusif (fermé) en particulier chez l'enfant.

Précautions d'emploi

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - Allaitement

Ne pas appliquer sur les seins pendant l'allaitement.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

Posologie

Irritation de la peau : 1 à 3 applications par jour en couche mince.

Mode et voie d'administration

Voie cutanée.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

Comme tout produit actif, ce médicament peut chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants.

NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

À conserver à une température inférieure à 25 °C.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

Mars 1999.



Les Laboratoires Boiron participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non. Le dispositif mis en place par CYCLAMED ne concerne que la France métropolitaine.