



métaspirine®

comprimé

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que METASPIRINE, comprimé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE METASPIRINE, comprimé ?
3. COMMENT PRENDRE METASPIRINE, comprimé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER METASPIRINE, comprimé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. Qu'est ce que METASPIRINE, comprimé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?

ANTALGIQUE ET ANTIPYRETHIQUE.

Ce médicament contient de l'aspirine. Il est indiqué dans les maladies avec douleur et fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, et courbatures chez l'adulte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE METASPIRINE, comprimé ?

Ne prenez jamais METASPIRINE, comprimé dans les cas suivants:

- A partir du 6^{ème} mois de la grossesse
- allergie à l'aspirine ou à un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens),
- ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,
- maladie hémorragique ou risque hémorragique,
- traitement avec des anticoagulants oraux quand l'aspirine est prescrite à des doses élevées (supérieures ou égales à 3 g par jour),
- traitement en cours par le méthotrexate (doses supérieures à 15 mg/semaine),
- enfant de moins de 15 ans en raison de la présence de caféine.

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ, sauf avis contraire de votre médecin,

En cas d'allaitement

En cas de traitement par :

- autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (pour des doses élevées d'aspirine soit supérieures ou égales à 3 g par jour),
- des anticoagulants oraux lorsque l'aspirine est utilisée à une dose inférieure à 3 g par jour,
- l'héparine,
- les uricosuriques (médicaments de la goutte),
- la ticlopidine,
- l'énoxacine.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec METASPIRINE, comprimé :

Mises en garde

Des syndromes de Reye (maladie rare mais très grave associant principalement des troubles neurologiques et une atteinte du foie) ont été observés chez des enfants présentant des maladies virales et recevant de l'aspirine.

En conséquence:

- en cas de maladie virale, comme la varicelle ou un épisode d'allure grippal: ne pas administrer d'aspirine à un enfant sans l'avis d'un médecin,
- en cas d'apparition de trouble de la conscience ou du comportement et de vomissements chez un enfant prenant de l'aspirine, prévenez immédiatement un médecin.

Précautions d'emploi

Avant de prendre de l'aspirine, il est nécessaire de CONSULTER VOTRE MEDECIN en cas :

- de goutte,
- d'antécédents digestifs; hémorragie, ancien ulcère de l'estomac ou du duodénum,
- de maladie des reins,
- d'asthme: la survenue de crise d'asthme, chez certains sujets, peut être liée à l'allergie à l'aspirine ou aux AINS; dans ce cas, ce médicament est contre-indiqué,
- de règles importantes ou contraception par stérilet.
- L'aspirine augmente les risques hémorragiques dès les très faibles doses et ce même lorsque la prise date de plusieurs jours. PREVEZ VOTRE MEDECIN TRAITANT, LE CHIRURGIEN, L'ANESTHESISTE OU VOTRE DENTISTE, dans le cas où un geste chirurgical, même mineur, serait envisagé.

Si la douleur persiste plus de 5 jours, la fièvre plus de 3 jours ou si elles s'aggravent, ne continuez pas le traitement sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Ce médicament peut entraîner une insomnie, il ne doit pas être pris en fin de journée.

EN CAS DE DOUTE N'HESITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment les anticoagulants oraux, les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'héparine, la ticlopidine et les uricosuriques (benzbromarone, probénécide), IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse-Allaitement

Grossesse

1) Au cours des **5 PREMIERS MOIS** de votre grossesse, votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament de façon occasionnelle.

2) A partir du **6^{ème} MOIS DE GROSSESSE** vous ne devez EN AUCUN CAS prendre DE VOUS-MEME ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur un plan vasculaire et rénal, et cela même avec une seule prise et même lorsque votre enfant est à terme.

Il peut arriver toutefois, *dans des cas très particuliers*, que votre cardiologue ou votre gynécologue vous prescrive de l'aspirine à *doses très faibles* qui ne sont pas celles utilisées dans le traitement de la fièvre ou de la douleur. Dans ce cas, respectez STRICTEMENT l'ordonnance de votre médecin.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. En conséquence, l'allaitement est déconseillé. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que la caféine peut induire une réaction positive des tests pratiqués lors de contrôles antidopage.

3. COMMENT PRENDRE METASPIRINE, comprimé ?

Posologie

RESERVE A L'ADULTE

Les prises doivent être espacées d'au moins 4 heures.

Adulte :

A titre indicatif : 1 comprimé à 475 mg d'aspirine, à renouveler si nécessaire au bout de 4 heures, sans dépasser la dose de 6 comprimés par jour. En cas de douleur plus intense, 2 comprimés par prise.

La posologie quotidienne d'aspirine maximum recommandée est de 3 g.

Sujet âgé :

A titre indicatif : 1 comprimé à 475 mg d'aspirine, à renouveler si nécessaire au bout de 4 heures, sans dépasser la dose de 4 comprimés par jour. En cas de douleurs intenses, 2 comprimés par prise.

La posologie quotidienne d'aspirine maximum recommandée est de 2 g.

CE MÉDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE OU PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRECISE /

**IL NE PEUT PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS
NE LE CONSEILLEZ PAS A UNE AUTRE PERSONNE.**

Mode d'administration

VOIE ORALE.

Les comprimés sont à avaler avec un grand verre d'eau.

Fréquence d'administration

Les prises réparties dans la journée permettent d'éviter les pics de fièvre ou de douleurs. Elles doivent être espacées d'au moins 4 heures.

En raison de la présence de caféine, évitez la prise de ce médicament en fin de journée.

Durée du traitement

Ne pas dépasser 3 jours de traitement en cas de fièvre, ni 5 jours de traitement en cas de douleurs sans l'avis de votre médecin.

NE PAS UTILISER DE FACON PROLONGEE SANS AVIS MEDICAL

Si vous avez pris plus de METASPIRINE comprimé que vous n'auriez dû: au cours du traitement, il est possible que surviennent des bourdonnements d'oreille, une sensation de baisse de l'audition, des maux de tête, des vertiges: ils traduisent habituellement un surdosage de l'aspirine.

IL FAUT ALORS INTERROMPRE VOTRE TRAITEMENT ET PREVENIR UN MEDECIN.

En cas d'intoxication accidentelle, **CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.**

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, METASPIRINE, comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Il faut immédiatement arrêter votre traitement et avertir votre médecin dans les cas suivants:

- réactions allergiques de type éruption cutanée, crise d'asthme, œdème de Quincke (urticaire du visage avec gêne respiratoire),
- hémorragie (rejet de sang par la bouche ou dans les selles, coloration des selles en noir) Celle-ci est d'autant plus fréquente que la posologie utilisée est élevée
- bourdonnements d'oreille, une sensation de baisse de l'audition, des maux de tête: ils traduisent habituellement un surdosage de l'aspirine,

Avertissez votre médecin en cas de douleurs abdominales, saignements de nez, des gencives. Des cas d'ulcère de l'estomac ont été rapportés.

Possibilité d'excitation, d'insomnies et de palpitations en raison de la présence de caféine.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER METASPIRINE, comprimé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser METASPIRINE, comprimé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient METASPIRINE, comprimé ?

La substance active est:

Acide acétylsalicylique 475 mg

Caféine 25 mg

Pour un comprimé

Les autres composants sont:

Amidon de maïs, cellulose microcristalline.

Qu'est-ce que METASPIRINE, comprimé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimés. Boîte de 30.

Titulaire/Exploitant

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC
100, Route de Versailles BP23

78164 Marly-le-Roi Cedex

Fabricant

FAMAR ITALIA SpA
VIA ZAMBELETTI, 25
BARANZATE, 20021 MILANO (MI)
ITALIE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est février 2009.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l' Afssaps (France).



GlaxoSmithKline Santé Grand Public
BP 23
78164 Marly Le Roi Cedex