

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) DENOMINATION

OPHTASILOXANE[®], collyre

b) COMPOSITION

Diméticone qsp10 ml

c) FORME PHARMACEUTIQUE

Collyre. Flacon compte-gouttes de 10 ml.

d) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

AUTRES MEDICAMENTS OPHTALMOLOGIQUES.

(S = organes sensoriels.)

e) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE / EXPLOITANT

Laboratoires ALCON

4, rue Henri Sainte-Claire Deville

F-92563 RUEIL-MALMAISON Cedex

f) NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

Laboratoires ALCON

23, avenue Georges Ferrenbach

B.P. 83

F-68240 KAYSERSBERG

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

(INDICATIONS THERAPEUTIQUES)

Ce médicament est préconisé comme protecteur de la surface de l'œil.

3. ATTENTION !

a) DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) MISES EN GARDE SPECIALES

Ne pas injecter. Ne pas avaler.

c) PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas prolonger le traitement au delà de la date prévue par le médecin.

- Refermer soigneusement le flacon après usage.

- Ne pas toucher l'œil avec l'extrémité du flacon.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

d) INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre 15 minutes entre chaque utilisation.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

e) GROSSESSE - ALLAITEMENT

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

