

Solacy[®] PEDIATRIQUE

Comprimé pour suspension buvable.

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

pour un comprimé de 243 mg :

L-Cystine	36,30 mg
Soufre précipité	11,00 mg
Acétate de vitamine A enrobé	
quantité correspondant en rétinol	1 000 UI
Levure Saccharomyces cerevisiae	38,70 mg

Excipients : Cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, acide citrique anhydre, cyclamate de sodium, gélatine, saccharose, amidon de maïs, anti-oxydant (BHT), arôme fraise (maltodextrine, gomme arabique, dextrose, gamma undécalactone, acide butyrique, butyryllactate de butyl-isobutyrate de cinnamyle, diacétyle, di-n-propylcétone, isovalérianate d'éthyle, acétate d'héliotropyle, octine carbonate de méthyle, salicylate de méthyle, éthylvanilline, vanilline, maltol, éthylmaltol, héliotropine, bétanaphthyléthyléther, aldéhyde benzoïque).

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pour suspension buvable - Boîte de 60

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

R05X Autres médicaments du rhume (R. Système respiratoire)

NOM ET ADRESSE

DE L'EXPLOITANT : Laboratoires GRIMBERG - 19, Rue Poliveau - 75005 PARIS - Tél. : 01 55 43 34 00

DU FABRICANT : Laboratoires GRIMBERG - ZA des Boutries - 5, Rue Vermont - 78700 Conflans Ste Honorine

DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Traitement symptomatique d'appoint des affections rhinopharyngées de l'enfant de plus de 6 mois.

ATTENTION !

DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

Eviter de prolonger le traitement en cas d'intolérance digestive.

Cette spécialité contenant de la vitamine A (rétinol), tenir compte des doses administrées en cas de prise simultanée d'une autre spécialité contenant cette vitamine.

Chaque comprimé contient 1000 UI de vitamine A (rétinol), il convient de respecter impérativement les posologies recommandées afin de ne pas dépasser les apports nutritionnels quotidiens conseillés en vitamine A, figurant ci-dessous :

- nourrissons <1 an = 1250 - 1330 UI
- enfants de 1 à 3 ans = 1330 UI
- enfants de 4 à 12 ans = 2000 - 2700 UI
- adolescents = 2700 - 3300 UI

*EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).*

PRECAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN, en particulier signaler toute prise de médicament contenant de la vitamine A.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Bien que l'usage de ce médicament soit réservé à l'enfant, l'attitude à adopter pendant la grossesse et l'allaitement est mentionnée à titre informatif. Chez la femme adulte enceinte ou qui allaite, compte tenu de l'apport alimentaire quotidien, il est recommandé de ne pas dépasser une dose journalière de 5000 UI de vitamine A apportée par des médicaments.

En conséquence, ne pas dépasser la posologie recommandée par votre médecin.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Saccharose

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

POSOLOGIE

RESERVE au nourrisson de plus de 6 mois et à l'enfant

-	de 6 mois à 30 mois	:	1 comprimé par jour, pendant 3 mois
-	de 30 mois à 5 ans	:	2 comprimés par jour, pendant 3 mois
-	à partir de 5 ans	:	3 comprimés par jour, pendant 3 mois.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale

Il est IMPERATIF DE DISSOUDRE LE COMPRIME dans un peu d'eau ou tout autre liquide froid avant de prendre ce médicament, car la prise de comprimé non dissous chez l'enfant de moins de 6 ans peut entraîner une fausse route (risque d'avaler de travers et de s'étouffer).

FREQUENCE ET MOMENT AUXQUELS LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE

A prendre de préférence au cours du repas.

DUREE DU TRAITEMENT

En cure de 3 mois.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

En cas de prise par erreur d'une dose trop élevée, des manifestations de surdosage en vitamine A peuvent apparaître. Consultez votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Possibilité de troubles digestifs (douleurs d'estomac).

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 30 °C.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE : 08 juin 2005

1280056-09/07 L