

SPRAY*PAX®

Solution pour pulvérisation cutanée

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE. :

| | |
|---------------------------------|------------|
| Extrait de pyrèthre à 25% | 3,63 g |
| Butoxyde de pipéronyle | 7,27 g |
| Isododécane | 89,10 g |
| | pour 100 g |

FORME PHARMACEUTIQUE :

Flacon pulvérisateur de 8 g.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

PEDICULICIDE ET LENTICIDE (P : Produits antiparasitaires).

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE ET EXPLOITANT

LAB. OMEGA PHARMA FRANCE - BP 80
92321 CHATILLON Cedex

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT :

AEROFARM - 468 Chemin du Littoral - BP 89
13321 MARSEILLE Cedex 16

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT :

SPRAY PAX, solution pour pulvérisation cutanée, constitue un traitement contre les poux et les lentes du pubis (morpions).

Il contient des pyrèthrines naturelles et du butoxyde de pipéronyle.

ATTENTION

DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT :

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans le cas suivant :
- allergie à l'un des constituants du produit.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISE EN GARDE :

Attention, ce médicament contient des produits inflammables (pétrole). Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

NE PAS AVALER.

- Eviter tout contact avec les yeux ou les muqueuses. En cas de contact accidentel, rincer abondamment à l'eau.
- Ne pas appliquer sur une peau présentant des lésions de grattage infectées.
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN.
- Il est recommandé de traiter simultanément les partenaires sexuels contaminés, et de désinfecter les sous-vêtements et la literie.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT :

USAGE EXTERNE

• POSOLOGIE :

- Une application suffit à détruire la totalité des poux et des lentes du pubis.

• MODE D'ADMINISTRATION :

- ***Maintenir le flacon tête en haut pendant toute la durée de l'application.***
- Pulvériser par brèves pressions l'ensemble de la région pileuse, jusqu'à imprégnation complète de la zone à traiter.
- Laisser en contact pendant 30 minutes, puis laver au savon et rincer abondamment.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS : COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- Possibilité d'irritation transitoire avec picotements lors de l'application du produit.
NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

CONSERVATION : NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION INSCRITE SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE : juillet 2000.

Médicament autorisé N° 3 400 935 367 358